

## La farfalla del mese

a cura di M.Cristina Bertonazzi



### Agosto: *Lycaena dispar* (Haworth, 1803)

La licena, *Lycaena dispar*, è una farfalla con apertura alare di circa 30-40 mm. Il maschio è di color arancione dorato con stretti bordi scuri; sulle ali anteriori sono evidenti due punti neri vicino all'apice.

La femmina è più scura del maschio, i bordi delle ali sono più estesi e i disegni puntiformi più numerosi; nelle ali posteriori la zona basale è spolverata di squame marroni.



Il rovescio delle ali è simile in entrambi i sessi: le anteriori sono di color arancione pallido con macchie nere; le posteriori sono grigie con sfumature azzurre vicino alla base.

Sono presenti numerose macchie puntiformi nere circondate da un bordo bianco ed una fascia arancione vicino all'apice.

Frequenta le zone umide di pianura (prati umidi, paludi, acquitrini) dal livello del mare a 400 m di altezza.

Un tempo molto comune questa specie, in seguito alla scomparsa degli habitat per lei naturali determinata dalle continue opere di bonifica, è

diventata sempre più rara e, in alcune zone, è addirittura scomparsa. Per questo motivo questa farfalla è considerata una delle specie più sensibili fra i Lepidotteri diurni europei tanto che è stata inserita nell'allegato IV della citata direttiva 92/43/CEE che indica “...le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.”



I bruchi si cibano di *Rumex* sp., in particolare di *Rumex hidrolapathum* (tabacco d'acqua), *Rumex crispus*, *Rumex obtusifolius*.

Si osservano in media due generazioni all'anno, talvolta anche tre. Questa specie sverna come larva di seconda età in foglie arrotolate.